Bragiola Vass3R01s161-165 Van 13 S40 **€INA** Collection Vassal-Montpellier Bragiola 13 540





Désignation: Bragiola

Clos Planche 13 c8té 5 Noble

Vigueur

Charge:

Date de mâturité (18.8.16)

A1 0

D2 - 2

D3 2

D4 0

D5 0

CD 1

Désignation: Bragiola 
Clos Planche 13 Côté & No 40

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 2-9-52

A-2 P 1 +3

H-2 25 Apple

7: la 22.9.1958 Paro +1

Bragiola
Désignation:

Clos Planche/3 coté S Nº 40

Vigueur: 2

Charge :

Année 1956

Planche

Planche

Osté 13.540

Nombre total

Nombre total

Année 1956

Planche

DATES

ANNée 1000

ANN

Année : 1960

Ne Bragisla . Planch	13540 . Côté.
----------------------	---------------

	!Nombre	!	DATES
	1	1 12.3	15,3
F	香	!	
2	113	! 9	M
3	17	! 2	7
4	111	! 3	17 1 1 1 1 1
5	! 8	! 2	3 De 15.3 60 x 1
=====			

ANNEE 1989

NOM Bragisla = syrah EMPLACEMENT 3 R1 A161-165

Souche	Nbre yeux	Pébour	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v	fin	Maturlita
1 2 3 4 5	4244			74564	14	25.5	30.5	2,6	24.7	1,8	7,8	
Pot	18 urritu	re : 0	The state of the s	26 Mill.	. 0	Port	· mi	erige	,	Viqueu	ır :	3,5

AMMEE: 1996

HOM Bragiola = Syrah EMPLACEMENT. 3 R1 x161. 165

015030 DISA4

	000											
ouche	Whre yeux	And Administration of the last	mi/déb			Flor	mi/f			mi/v	fin	Maturité
1	4		25.31	0								***
2	4		25.3	V								
3	6	22 3	883	0	Grappe	1 9 -	M - B	Dim	•	Compac	cité	: L - K- C
Ą	4	22.3	2834	0	Four:							
5	6	22,3	2834	0	naie :			-		3		
					(	disc-sp	ph-eII.	-0v-0l	bov-cyl	-fus		
	De	fs. 3,	36(+12)		Couleu						col	oré
					Saveur	: 5 "	m - ai	r - fo	ox - he	erb		
					Pépins	: avec	- apy	yrène				
					Port :			V	igueur	:		
		,										
												~

Temois 0150 30 Braziola.

Tamoin

ANUEL: 1997

Sych = Bragiola. MMMANTENT 3R18161-165 HOM

whe	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/dob	ubre grap	Ferti- lité	r to dőbűE	mi/E	fin	vo debut	mi/v	f.i.n	maturit.
1 2 3 4 5	10Th 8 Th 10Th 6 6 ho	7.3 10.3	143	5 8 8 4 7 ho	Coulent Saveur Pépins Fort :	: G TG HS0-	H - P  Mil  Sph-el  Gr-Rs-  m - a	1 : - P D 1-ov- Rg-N L - fo	im: obov-c; Jus ox - he	yl-fus : inc erb		1.9 += : 1, - 11 -C

ANUME: 1858

HOM

Syrah EMPTINOPERET 3 RUSSEL 165

0150-30

ella:	Hbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/E		võ dēbut	raison mi/v		Maturité
1	7	15,3	26 = 3	0 3	2	275	2.6	6.6	20-7	27.7	4.8	31.8
3 d 5	6 8 31	26.3 23.3 16.3	29.3	0 1 4 7	Pour : Baie :	7.G -	MIL sph-el	<u>I</u> : - P <u>D</u> 1-ov-	im :	yl-fus		: 1, - M -C
		D.le	24.3.38	(+M)	4	: ave		yrène				

									·n	Tem	oin
ANGEE:		N 70)30		MARIAC	ROPINC	3 Rs.	s.161.			-1	n
iche   Nbre	Débour	remont mi/dob	and	Ferti- lité	Floi debut	mi/E	fin	Või dehut	mi/v	fin	Maturité
711 9	1913 16.3 16.3 16.3 3.le	23-3 19.3 19.3 23-3	7945	Coulet Saveur	TG - disc- ir : B- is : ave	M · P  MII  J · M  sph-el  Gr-Rs- m · a	Dim  1: - P D  1-ov- Rg-N  oyrène	oim: obov-c Jus ox - h	yl-fus : inc	<u>citő</u>	: 1, - 11 -C

Désignation: Bragiola

VASSAL Planche XIN Côté S Nº 40 Souche 12345

## (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

4/31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

duveteux 8 - cotonneux 9.

6 2 30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 🗇 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à

plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Dar :

No ordre Désignation: Bragiola Phanche 13 côté S Nº 40 souche '1 23 4 5 VASSAL (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 45 - glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 9 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. · 129 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 . 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

par de grapper Truel 31-5-54

10 9 .

F

Nº ordre

Désignation: Bregirla

VASSAL Planche 13 côté S Nº 4.0 souche 126)45

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.

  37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.

  38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.

  38 bourgeon: coloré 7 vert 8.
  - (I) FLEUR
  - 39 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

No ordre

Désignation

Bragida

VASSAL

planche 13 côté 5 Nº 40 souche 1 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cctonneux 9,
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.
  - limbe: glabre 4 séteux 6 velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8) - cotonneux 9.

- Limbe: plan - en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobos; plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unia condulée 2 finament bullée 3 gross terement bullée 4 gaufrée 5 plissée au print pétiolaire 6.
  - 📝 Nervures : face supérheure : verte 🔂 point pétiolaire rouge 2 particllement rauge 3 - enthèrement rouge 4.

- face inférioure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

-- Couleur ; vert jaune 1 -- vert franc 2 -- vert foncé 3 ·
vert plombé 4 -- autre 5.

#### PETIONE

3 - long 1 - moven 2 - court (3).

- glabre 4 sétoux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloró 1 partiellement coloré (2) autra 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
  - angle pótiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

BRoch

Nº ordre Bragisla Désignation VASSAL planche Moôté & N40 souche 1 2 0 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne @- grande 3. - Face supérieure : limbe et nervures : glabre () - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - auveteux 6 - cotonneux 9. st limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 🕔 révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan 🗗 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5. 66 - Surface : unie ! - ondulée 2 - finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. 34- Nervures : face supérieure : verte 10- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 🗽 face inférieure : verte 🛈 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4, - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 19- long 1 - moyen 2 - court). 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- angle péticle/limbe : infórieur à 90° (1) égal à 90° - (2) -

- angle pótiele/rameau : inférieur à 90° (:) - égal à 90° (2) -

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

supérieur à 90° (3)

supérieur à 90° (3).

11 VIL 1550 Rouquies

```
Bragiola
             planche 13 côté S Nº40 souche 1 2 3 4 5
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)
                                     BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8.
   - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noix 5
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
   - A jus incolore(1) - coloré 2,
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long(1) - moyen 2 - court 3.
   - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
   - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
  - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
   - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

Nº d'ordre

Désignation

Rouguil 5.9-56

# Bragiola 13540 Sarment de vigne

Saille

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                   autre (4)-
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
    \mathbf{n}
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            s plus foncé (7), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon péticlaire : étroit (1), large (2).
                       : saillant (1), effacé (2)
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                             dant (4).
```

haudier\_

Nº d'ordre : 1.33501 . Désignation: . BRAG-10-A. Origine : Emplacement: . . . . Vas. 13.540 . . Vign. 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3 9 - L<sub>1</sub>/ L. . . . . . . . . . 1 - 2-3 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 . . . . 1 - 2 - 2 . 16 - Dents : Forme 17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -(2)- 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : : 1-2-3 Direction : 4-5 Forme Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

handrer\_

# Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année

2001

Observateur

Code cépage : Nom cépage

Code clone: Syrah N

Emplacement 3 KI S161-165

## Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9 oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 -

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4

# Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9

## Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)
1	5	13,3	16.3	2
2	H	9.3	13.3	2
3	3	13:3	16.3	2
4	5	9 - 3	13,3	5
5	3	13,3	16-3	1
Moyenne	20			12×10=12

Fertilité (grappe/10 yeax)

+11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité
18/05	24/05	20/05		20/07	25/7	30/07	(oiv 304) 28 108

Début aoûtement (oiv 306)

Cemoin

# Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

2000 Année:

Observateur:

Nom cépage: Syroth N Code clone: 30 Emplacement: 3 RIALGI-165

## Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 rouge violet 5.

## Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe: très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9

#### Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	Н	17.3	2h.3		(Brapper to Jean)
2	6	17-3	28,3		
3	5	17-3	24.3		
4	9	17-3	28,3		
5	8	17-3	2813	11	
Moyenne	32		26.3.2000	11	2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement
19/05	2/6	5/6		24/07	31 107	16/08	28/108	(oiv 306)

+4

+2